

Articles from Ramamental

ผลข้างเคียงของยารักษาโรคสมาธิสั้น

2013-06-25 14:06:08 admin

ผลข้างเคียงของยา **Atomoxetine**



Atomoxetine แตกต่างจาก

Methylphenidate ตรงที่...



- ยาไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีหลังรับประทาน
- ต้องรอ 2 - 4 สัปดาห์หลังจากได้ยาที่ขนาดเหมาะสมจึงจะเห็นผลการรักษา



Atomoxetine แตกต่างจาก

Methylphenidate ตรงที่...

- เมื่อรับประทานยาต่อเนื่องฤทธิ์ยาจะออกตลอด 24 ชม.
- ดังนั้นผลข้างเคียงสามารถเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้



ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงของยาจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น ผู้ป่วยหลายรายสามารถรับประทานยาได้โดยไม่มีผลข้างเคียง



ผลข้างเคียงของยา Atomoxetine

- ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ...
- ปวดหัว
- ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
- เบื่ออาหาร
- นอนไม่หลับ หรือ ง่วง
- รู้สึกหงุดหงิด หรือ เพ้อผยๆ



ผลข้างเคียงของยา Atomoxetine



- ปวดหัว ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกหงุดหงิด เพ้อผียๆ หรือ ไม่สบายตัวต่างๆ
- ถ้าเป็นเพียงเล็กน้อยและอยู่ในช่วงเริ่มการรักษา อาจให้ยาช่วยตามอาการ
- ถ้าเป็นมาก ควรหยุดยาแล้วปรึกษาแพทย์ผู้รักษา



ผลข้างเคียงของยา Atomoxetine

อาการเกี่ยวกับการนอน



□ ถ้านอนไม่หลับ ...

ให้รับประทานยาช่วงเช้า

□ ถ้าง่วง ...

ให้รับประทานยาช่วง
ก่อนนอน

ผลข้างเคียงของยา Atomoxetine

อาการเบื่ออาหาร

□ มีอาการเพียงเล็กน้อย

ให้จัดมื้ออาหารให้เล็กลง
แต่บ่อยครั้งมากขึ้น

□ มีอาการมาก

ควรรอด หรือ หยุดยา



ผลข้างเคียงของยา Atomoxetine

ถ้าสงสัยว่าอาการ
บางอย่างเป็นผลจากยา

ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา



Tweet

tumblr

my

Share

Email