

Factors and Psychosocial Profiles of Intimate Partner Violence among Pregnant Women*

Nanthana Thananowan, Sirirat Leelacharas

Corresponding author: N. Thananowan
E-mail: sintn@mahidol.ac.th

Nanthana Thananowan RN PhD
Assistant Professor, Faculty of Nursing,
Mahidol University
Bangkok, Thailand

Sirirat Leelacharas RN PhD
Clinical Instructor, Department of
Nursing, Faculty of Medicine
Ramathibodi Hospital,
Mahidol University
Bangkok, Thailand

* This study is a part of a research project
granted by TRF and CHE in 2007

Abstract:

Purpose: To investigate factors and psychosocial profiles (e.g., stress, social support, and self esteem) of intimate partner violence (IPV) among pregnant women.

Design: Descriptive comparative design

Methods: The sample was comprised of 420 pregnant women who received their antenatal care visits at a university hospital in Bangkok. Data was collected through a set of structured questionnaires which were then analyzed by descriptive statistics, chi-square test, and independent t-test.

Main Findings: Compared to non-abused pregnant women, abused pregnant women rated significantly higher in areas of divorce, separation and remarriage, alcohol abuse, smoking, unplanned and unwanted pregnancy ($p < .05$). They also had significantly shorter length of marriage, lower levels of education, and the greater number of gravidarum and abortion ($p < .05$). Moreover, abused pregnant women had significantly higher stress, but lower social support and self-esteem than non-abused pregnant women ($p < .05$).

Conclusion and recommendations: Based on these findings, nurses should pay attention and increase awareness of IPV among pregnant women as well as perform universal screening of IPV aimed at reducing such violence experienced and negative health outcomes during pregnancy.

Keywords: factors, psychosocial profiles, intimate partner violence, pregnant women

J Nurs Sci 2011;29(1): 37 - 44

ปัจจัยและผลทางจิตสังคมของความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรี ตั้งครรภ์*

นันทนา ธนาโนวรรณ สิริรัตน์ สีสางธวัช

Corresponding author: นันทนา ธนาโนวรรณ

E-mail: sintn@mahidol.ac.th

นันทนา ธนาโนวรรณ RN PhD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาล

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สิริรัตน์ สีสางธวัช RN PhD

อาจารย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ (งานการ

พยาบาลอายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

* งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยซึ่งได้รับ

ทุนจาก สกว. และ สกอ. ประจำปี 2550

บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยและผลทางจิตสังคม (ได้แก่ ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง) ของความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยายเปรียบเทียบ

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์จำนวน 420 คน ที่เข้ารับการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย: เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับความรุนแรง สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงมีประวัติหย่าร้างหรือแยกทางกับสามี การแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานครั้งที่สอง อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ตีมีสุรา และสูบบุหรี่ ไม่มีการวางแผนการตั้งครรภ์ และเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) สตรีตั้งครรภ์เหล่านี้ยังมีระยะเวลาสมรสสั้น มีระดับการศึกษาน้อยและมีจำนวนครั้งของการตั้งครรภ์และการแท้งมากกว่าสตรีตั้งครรภ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญ ($p < .05$) นอกจากนี้ยังพบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงจะมีความเครียดสูง ได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อย และมีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่ำกว่าสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับความรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญ ($p < .05$)

สรุปและข้อเสนอแนะ: จากผลการวิจัยครั้งนี้ พยาบาลควรให้ความสำคัญและตระหนักเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์และควรทำการคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรส และดูแลเพื่อลดอัตราการเกิดความรุนแรงดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพขณะตั้งครรภ์

คำสำคัญ: ปัจจัย ผลทางจิตสังคม ความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรส สตรีตั้งครรภ์

J Nurs Sci 2011;29(1): 37 - 44