

รายงานการวิจัย

ผลของการสวมกางเกงหลังคลอดกับการสวมผ้าถุง ในสตรีหลังคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาลรามธิบดี

นิตยา โรจนนिरันดรภิกข *

พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ **

Rotjananirankit, N., & Disornatiwat, P.

Effects of postpartum pant and Sarong among post vaginal delivery women
in Ramathibodi Hospital.

Thai Journal of Nursing, 62(4), 43-49, 2013.

Key Words : Postpartum Pant, Sarong, Postpartum Women

บทคัดย่อ

งานวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการสวมกางเกงหลังคลอดกับการสวมผ้าถุงของสตรีหลังคลอดขณะนอนพักในโรงพยาบาล ความพึงพอใจของแพทย์ต่อการตรวจแผลฝีเย็บของสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกงหลังคลอดกับสวมผ้าถุง และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่พยาบาลต่อการดูแลแผลฝีเย็บของสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกงหลังคลอดกับสวมผ้าถุง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 90 คน เป็นสตรีหลังคลอดแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาล กลุ่มละ 30 คน เลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของสตรีหลังคลอดต่อการสวมกางเกงหลังคลอดกับการสวมผ้าถุง แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการตรวจแผลฝีเย็บของแพทย์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ

ดูแลแผลฝีเย็บของเจ้าหน้าที่พยาบาล แบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับหาความเที่ยงได้ค่าเท่ากับ 0.75 0.80 และ 0.79 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t- test

ผลการวิจัยพบว่าสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกงหลังคลอดมีความพึงพอใจสูงกว่าสตรีหลังคลอดที่สวมผ้าถุง แพทย์ที่ตรวจสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกงหลังคลอดมีความพึงพอใจต่อการตรวจแผลฝีเย็บสูงกว่าแพทย์ที่ตรวจสตรีที่สวมผ้าถุงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลสตรีหลังคลอดที่สวมกางเกงหลังคลอดมีความพึงพอใจต่อการดูแลแผลฝีเย็บไม่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลสตรีหลังคลอดที่สวมผ้าถุง

* หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติกรรม ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

** อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล