



มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

# ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5-11 ปี

กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก เนื่องจากพบว่าเด็กมีอัตราการเป็นโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยได้รับเชื้อจากภายในบ้าน โรงเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ

## ประโยชน์ของวัคซีน




ลดอัตราการเสียชีวิต



ลดการรักษาตัว

ในโรงพยาบาลหรือในหอผู้ป่วยวิกฤต



ลดการเกิด MIS-C

เป็นกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ เกิดหลังเป็นโควิด-19 มีอาการคล้ายโรคคาawasaki โดยมีอาการไข้สูง ผื่น ตาแดง มือเท้าบวม ถ่ายเหลวและอาเจียน



## ขนาดวัคซีน

10 ไมโครกรัม  
(1 ใน 3 เท่าของ  
ขนาดที่ฉีดในวัยรุ่น  
และผู้ใหญ่)

ฉีด 2 เข็ม  
ห่าง 8 สัปดาห์

## การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน

- หากมีโรคประจำตัวให้ปรึกษาแพทย์
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- หากมีไข้สูงหรือไม่สบายมาก ควรเลื่อนการฉีดไปก่อน (ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีน)
- กินยาโรคประจำตัวตามปกติ
- หลีกเลี่ยงเรื่องเครียดหรือวิตกกังวล

\*หลังฉีดวัคซีน 1 สัปดาห์  
ไม่ควรออกกำลังกายหนัก

LINE Ramathibodi

**RAMA**  
CHANNEL

พศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>