



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาการข้างเคียง หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก



อาการข้างเคียงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคน

อาการไม่รุนแรงที่พบได้บ่อย



ปวดบริเวณที่ฉีด




อ่อนเพลีย



ปวดศีรษะ



ปวดเมื่อยตามตัว




มีไข้



คลื่นไส้ อาเจียน



อาการรุนแรงที่พบได้น้อย



• ชัก

• เจ็บแน่นหน้าอก

• หมดสติ



• ปวดศีรษะรุนแรง

• หายใจไม่ออก

• หอบเหนื่อย

คำแนะนำ

- 1 งดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมหนักเป็นเวลา 7 วัน
- 2 ถ้าเด็กมีอาการแพ้วัคซีน เช่น ใจสั่น เจ็บหน้าอก ผื่นลมพิษ หายใจไม่อิ่ม หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL

พศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>