



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข้อควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มักพบอาการที่แตกต่างกันไป ทั้งมีไข้ ปวดท้อง กินอาหารไม่ได้ อาเจียน ตบอักเสบ ตบโต เลือดออกผิปกติ สมองอักเสบ ซีก จนถึงเสียชีวิต การฉีดวัคซีนถือเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกัน โรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ



อายุตั้งแต่ 6-45 ปี



ฉีด 3 เข็ม แต่ละเข็ม ห่างกัน 6 เดือน



แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสเป็น โรคไข้เลือดออกได้ วัคซีนจะ**ช่วยลดความเสี่ยง**และอาการป่วยหนัก



วัคซีนเป็นชนิดเชื้อเป็น **ไม่เหมาะกับ** ผู้ที่ได้รับยากดภูมิ ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี คนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ และหญิงตั้งครรภ์

แม้วัคซีนจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ แต่การป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น โดยเฉพาะการป้องกันการถูกยุงกัด ก็ควรปฏิบัติ ได้แก่ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ท้ายากันยุง ใช้มุ้งและมุ้งลวด

LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL

พศ. นพ.ชนนเศรษฐ์ เตชะแสนศิริ
สาขาวิชาโรคติดต่อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>