



# ยุงลาย กัดร้าย ไขเลือดออก

ไขเลือดออก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ติดต่อกับคนสูดคน มียุงลายเป็นพาหะ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ถ้ามีอาการ มักมีไข้สูงลอย ปวดเมื่อย ปวดท้อง กินไม่ได้ อาเจียน มีผื่น หรือจุดเลือดออก บางรายมีเลือดออกมากผิดปกติ ตับอักเสบ ซึม ซ็อก และเสียชีวิต



## การรักษา

ไม่มียาต้านไวรัสเดงกี เป็นการรักษาตามอาการ



## การป้องกัน



ไม่ให้ถูกยุงกัด



ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย



วัคซีนชนิดฉีด มี 2 ชนิด

ชนิดที่มีแกนหลักเป็นไวรัสไข้เหลือง

- สำหรับอายุ 6-45 ปี ที่เคยเป็นไขเลือดออกมาก่อนแล้วเท่านั้น
- ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน

ชนิดที่มีแกนหลักเป็นไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่ 2

- สำหรับอายุ 4-60 ปี ทั้งที่เคยและไม่เคยเป็นไขเลือดออกมาก่อน
- ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน



วัคซีนทั้ง 2 ชนิดเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ยาเคมีบำบัด ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ควรเลี่ยงการได้รับวัคซีน